

下りをした おしりから 血が出た



関連項目

- 熱が出た
- 吐いた／血を吐いた
- おなかが痛い

- 動けないほど体がだるい
- 水分が摂れない
- 尿が半日以上出ていない
- 大量の血が出た
- 38℃以上の高熱がある
- 乳児・幼児のイチゴジャム状の血便
- 強い腹痛
- 何回も吐く
- 同じものを食べた人が同じ症状
- 海外旅行後

いいえ

はい
(ひとつでも)

すぐに時間外受診

- 水分は摂れている
- 少量の血・血便
- 尿が出ている
- 元気がある
- 機嫌が良い

はい

翌時間内受診

すぐに受診した方がよい場合に考えられる病気

- 子供 腸重積、重度脱水症、食中毒など
- 大人 虚血性腸炎、胃／十二指腸潰瘍、食中毒など

memo.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

受診を待つ間にできること

- ◎下りをしている時は、柑橘系、脂肪の多いもの、極端に熱いもの／冷たいものは控えましょう。消化の良いおかゆなどを中心に摂りましょう。
- ◎おしりから血が出ている時は、足を高くして安静にしましょう。
- ◎汚物の処理は手袋などで防護しながら行い、処理後はよく手を洗いましょう。